

樹雨 (きさめ)



2015年
10、11月号

(一社)いわき市薬剤師会
いわき市中央台飯野4-2-4-4F
☎ 0246-46-0430
FAX 0246-46-0431
URL <http://www.iwaki-pa.or.jp/>
発行 広報情報委員会

平成27年10月15日発行



麻薬受払等届について

9月30日は、麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づく平成27年分(平成26年10月1日～平成27年9月30日)の麻薬受払状況の取りまとめの日です。いわき市保健所から送付された「麻薬受払等届」に記入し、期限日までに提出してください。

提出先 **いわき市保健所 総務課医事業事係**
〒973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191番地
提出物 「麻薬受払等届」2部
3部作成し、内2部提出、残り1部は薬局で保管する
提出期限 **平成27年11月30日(月)**



研修会の予定

- 10月20日：いわき南部地区学術講演会
『合併症予防のための糖尿病診療』(小名浜オーシャンH)
- 10月23日：抹消動脈疾患に関するカテーテル治療の現状
(グランパークホテルパネックスいわき)
- 10月26日：いわき市医師会予防接種学術講演会
なぜ、すべての子供にB型肝炎ワクチン接種が必要なのか
(いわき市総合保健福祉C)
- 10月29日：白内障手術期における角結膜保護(ワシントンH)
- 10月30日：まちかど相談薬局強力員研修会
認知症サポーター養成講座(いわき市総合保健福祉C)
- 10月31日：バレット食道/癌の病態、リスクについて
(グランパークホテルパネックスいわき)
- 11月5日：第15回いわき在宅医療研究会
『地域包括ケアシステムと在宅医療』
(グランパークホテルパネックスいわき)
- 11月6日：第51回いわきアレルギー懇話会学術講演会
『アレルギー性鼻炎—舌下免疫療法を中心に』
(ワシントンH)
- 11月12日：慢性腎臓病フォーラム inいわき
『慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常の病態と管理』
(グランパークホテルパネックスいわき)
- 11月25日：第126回いわき漢方懇話会学術講演会
『内科医から見た女性疾患の漢方治療』
(いわき総合保健福祉C)

●各種お知らせ

○高度医療機器・医療安全対策の研修会について

11月29日(日) 同日開催

- 高度管理医療機器継続研修会
会場：ビックパレットふくしま
時間：午前10時～
- 医療安全対策等研修会
会場：ビックパレットふくしま
時間：午後1時～
(受講票・身分証(免許証等)を忘れずに)

○平成27年度いわき市医療安全対策研修会について

受講申込みされた方は、研修日等の確認をおねがいします。
日時 平成27年10月27日(木) 18:45～
会場 いわき市文化センター大ホール (18:15より受付)



○妥結率の報告について

妥結率については、報告年度の4月1日から9月30日までの妥結率の実績を同年10月に地方厚生(支)局へ報告することとされており、当年11月1日から翌年10月31日までの調剤基本料の未妥結減算の適否を判定します。

その際の添付資料に関する疑義として、**本年度は契約書の写しのみの提出だけで差し支えないこと(ただし妥結率の根拠となる詳細な資料は地方厚生(支)局等からの求めに応じて速やかに提出できるようにしておくこと)**など、取り扱いが一部緩和されています。

— TOPICS —



不妊治療における糖尿病薬の適用外使用について

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS または PCO) が原因での不妊治療を行う際、妊婦には禁忌とされているメトフォルミンが使用されるケースがあります。多嚢胞性卵巣症候群とは卵胞が卵巣の中にかくさんでき、ある程度の大きさにはなるのですが、排卵がおこりにくくなる病態です。不妊で多嚢胞性卵巣症候群と言われたのであれば、排卵障害が原因になっている可能性があります。このため下図のような排卵のための治療法が選択されます

一般的にまず用いられるのはクロミフェンでの内服治療です。妊娠した場合多胎の頻度はやや増えますが、卵巣過剰刺激症候群が起こりにくいとされています

また、注目されているのはインスリン抵抗性※改善薬のメトフォルミンです。欧米ではPCOSに広く使われており、日本でもよく使われるようになってきています。一般的にはメトフォルミンとクロミフェンを併用します。メトフォルミン服用は黄体形成ホルモン(LH)とインスリンを低下させ、卵巣アンドロゲン濃度を下げるのに有効であるという報告がされています。

添付文書から見ればPCOSにメトフォルミンを使うのは、適応の点でも、場合によっては妊娠してから投与する点から考えても「適応外使用」になります。担当医から十分な説明、薬剤師もしっかり理解した上で、薬剤師も疑義照会したり、患者さんに服薬指導をすることが大切です。

※インスリン抵抗性について

インスリン抵抗性が高いと体内のDHEA(デヒドロエピアンドロステロン)の分泌が低下してしまいます。

HEAはテストステロンの産生と大きく関連して、卵胞の成長や着床と関連しています。PCOSと診断された場合、インスリン抵抗性を改善させ、DHEAを高くさせないという意識が重要なのです。 光栄薬局 山口 雅之

◇PCOSで不妊の場合の治療法◇

- 生活習慣の改善
- クロミフェン単独
- メトフォルミン単独・クロミフェン+メトフォルミン
- クロミフェン+ステロイド・FSH(HMG)
- 体外受精・腹腔鏡下卵巣drilling



次号の樹雨は
12月15日発行予定です。

薬業スポーツ大会の結果や広報委員
の自己紹介等を記載予定!

